I'm not robot
reCAPTCHA
Continue

Traitement chlamydia pdf

L'accent mis sur les symptômes, le traitement et le dépistage de la clymmedia est une infection sexuellement transmissible (ITS) qui se transmet facilement pendant les rapports sexuels sans préservatifs. Il peut détruire les organes génitaux, le museau et la gorge. Les antibiotiques infectés peuvent être traités, et il existe des moyens de réduire le risque de climmedia ou de transfert, comme l'utilisation de préservatifs lors de chaque confrontation sexuelle. Nos mots sont tout au sujet de ce qui est lié à la langue -CATIE qui s'engage à utiliser. Les gens utilisent différentes conditions pour définir leur corps. Ce texte utilise des conditions médicales comme le rapport musculaire et l'infirmité pour expliquer les organes génitaux. D'autres préfèrent d'autres conditions, comme les parties privées, les pons ou les frontaux. CATIE reconnaît et accepte que les gens utilisent les mots qu'ils sont les plus à l'aise avec. Qu'est-ce que le clymedia? La Clymia est une infection sexuellement transmissible (ITS). Il peut détruire les organes génitaux, le museau et la gorge. Une personne atteinte de clymie peut transférer une autre personne pendant les rapports sexuels. Parce que beaucoup de personnes atteintes de clymie ne ressentent aucun symptôme, ils ne savent pas qu'ils ont l'infection. Lorsque les symptômes se manifestent, ils prennent habituellement de 2 à 3 semaines pour se préparer, mais peuvent apparaître jusqu'à 6 semaines après l'infection. Les symptômes courants varient selon la partie du corps : l'infection des organes génitaux peut être la dysenterie (un liquide anormal sort du museau ou de la masse musculaire) et la douleur dans l'urine (douleur). Une infection permanente peut causer des dyscharors ou des saignements ou des douleurs. Une infection de la gorge ou de la bouche peut causer une inflammation de la gorge. Si elle n'est pas traitée, clymedia peut causer une dysenterie, des douleurs à l'estomac ou des complications pendant la grossesse. Puis-je obtenir une réclamation? Les victimes de violence sexuelle peuvent également obtenir clymidea y compris ceux qui sont sexuellement actifs. Clymia est facilement transféré pendant les rapports sexuels sans préservatif. Cela inclut l'indamy et le sexe. Bien que cela arrive moins souvent, Clymia peut également être transféré : lorsqu'une personne avec une clymie dans la bouche ou la gorge donne des relations sexuelles orales à une autre personne, lorsque le contact sexuel avec un homme ou dans ses organes génitaux (inolongos ou rimming) Qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un doigt après le passage, de jouets ou de mains sur la camemia et le VIH pour une personne vivant avec le VIH, l'infection à la maladie peut augmenter la quantité de VIH dans son liquide corporel. Risque accru de transfert du VIH à des partenaires sexuels. S'ils y sont exposés pendant les rapports sexuels, une personne atteinte de clymie peut être plus à risque de vih. Qu'est-ce que je peux faire ? Utilisez un préservatif pendant la prévention des infections et le sexe. Utilisez des préservatifs ou des barrages dentaires pendant les rapports sexuels oraux. Il n'existe aucun vaccin qui protège contre les clymmedia. Si vous avez clymedia, la seule façon de s'assurer est de tester. Un médecin ou une infirmière peut faire un test pour vous. Le test consiste en un test de la gorge, séditante ou de la gorge ou de l'urine. Vous pouvez examiner toutes les parties pertinentes de votre corps de sorte que tous les différents types de relations sexuelles décrivent au médecin ou à l'infirmière. Lorsque vous vérifiez pour clymmedia, il est une bonne idée de tester pour d'autres infections sexuellement transmissibles (stas), comme le VIH. D'autres stase peuvent être transférées de la même manière que le clymmedia. Parlez de la fréquence à laquelle vous devriez être expérimenté pour votre fournisseur de soins de santé et d'autres stochas. Si vous êtes diagnostiqué avec clymmedia, les travailleurs de la santé publique vous parlera de la nécessité d'informer vos partenaires sexuels qui sont en face de la clymidea et les encourager à tester. Votre identité ne sera pas révélée. Le traitement peut être traité avec une dose d'antibiotique clymedia ou un traitement antibiotique à court terme. Si vous recevez une dose pour traiter l'infection, vous devriez attendre 7 jours avant d'avoir des relations sexuelles. Si vous êtes prescrit pilules à prendre pendant 7 jours, vous devriez attendre jusqu'à ce que vous avez pris toutes les pilules avant de commencer à avoir des relations sexuelles à nouveau. Si vous avez un ou plusieurs partenaires sexuels réguliers, vous devriez également recevoir un traitement avant d'avoir des relations sexuelles avec eux. Une fois que vous êtes traité, vous ne serez pas en mesure de déplacer le clymmedia sur vos partenaires sexuels. Toutefois, vous pourriez être affecté à nouveau. Le traitement de clymedia ne vous protège pas contre les futurs clymmedia. Crédits Cette fiche d'information a été créée en partenariat avec le Conseil canadien de l'information et de l'éducation sur les sexes (SEECCAN). La fiche d'information Clymia Resources-CATIE est traitée avec des médicaments Clymidia. Le traitement guérit entièrement l'infection. Les personnes touchées devraient recevoir un traitement dès que possible pour éviter les complications. Les médicaments pour le traitement clymmedia sont gratuits pour les personnes touchées et leurs partenaires sexuels. Pour obtenir Le LEA sera en mesure d'apporter un certain nombre de changements au lein. Ensuite, ils peuvent acheter des médicaments à la pharmacie, sur leur offre de carte d'assurance maladie. Il faut un certain temps pour traiter le traitement de précaution à prendre pendant le traitement. Pendant ce temps, la personne reste entavetomie. Ne pas transférer ou re-capturer la clymie, pour éviter les relations sexuelles avec la personne touchée et ses partenaires jusqu'à ce qu'ils ne reçoivent pas de traitement. Avant d'avoir des relations sexuelles, la victime et leurs partenaires devront attendre: jusqu'à la fin de leur traitement, s'ils doivent prendre les pilules pendant plusieurs jours, 7 jours après leur traitement, s'ils ont un traitement diététique. En outre, s'ils ont des symptômes, ils doivent attendre jusqu'à ce qu'ils aient complètement disparu. S'ils ne peuvent pas attendre, la personne touchée et leurs partenaires peuvent se protéger avec des préservatifs. Ils peuvent également utiliser un carré de latex pour couvrir le loup ou l'objet pendant les rapports sexuels oraux. Par conséquent, la bouche n'entre pas en contact direct avec les djinns. Pour faire un carré de latex, délier un préservatif, couper l'extrémité et le couper la longueur. Informer le partenaire qui a le clymedia doit informer leurs partenaires sexuels dès que possible. De cette façon, ils seront en mesure de tester leurs partenaires immédiatement, obtenir un traitement approprié et éviter les complications, pour éviter l'infection avec leurs partenaires. Nous avons sélectionné 14 études (2715 participants : 2147 (79,08 %) Les hommes et 568 (20,92 %) étaient des hommes. les femmes). L'étude a été menée à l'origine à la Clinique de gestion des IST. La taille des échantillons est de 71 à 606 participants. Les 29,7 jours réguliers. La concurrence entre une dose d'azastromochan et une dose de dyaccalana était plus élevée dans le groupe aztromecan pendant environ 7 jours ou deux fois par jour, traitement pour l'infection de clymia trachometas chez les hommes : échec microbiologique était plus élevé dans le groupe d'Aztoromecan (r-2 CI 95%-[1.36-4.41]; Participants 821-9; preuve de qualité intermédiaire), mais pour l'échec médical, les résultats montrent que les effets sont incertains (R-0.94, CI 95 lbs-[0.43-] . Numéro-525 : Numéro d'étude-3; Preuves de faible qualité). En termes d'incidence négative (ADA) chez les hommes, il y aura peu ou pas de différence entre les antibiotiques (R-0,83, IC 95 lbs- [0,67-1,02] . En ce qui concerne le traitement pour les femmes Par Climia Trachotas, l'effet sur l'échec de la microbiologie était incertain (R-1.71, CI 95 lbs-[0,48-6,16] . . . . le nombre de participants - 338 . . . . . Aucune étude n'a estimé les échecs médicaux ou les événements négatifs chez les femmes, mais nous avons constaté que les stoïques azatharmiens ont probablement moins d'effets secondaires dans les deux (R-0,83, CI 95 lbs- [0,71-0,98] . Pour la deuxième comparaison, le médicament est un vaccin par rapport à l'ofloxacine : chez les hommes, l'effet était incertain sur l'échec microbien (R-8.53, CI 95 lbs-[0.43-167.38], I2 n'est pas applicable. Nombre de participants - 80 : Étude no 2 : Preuves de faible qualité, ainsi que défaillance clinique (R-0,85, CI 95%- [0,28-2,62] . . . . . Chez les femmes, l'effet sur l'échec médical était incertain (R-0.94; IC 95 lbs-[0.39-1.25]: I2-39 : Nombre de participants - 127 , Numéro d'étude-2; Preuves de très faible qualité). En termes d'incidence négative, l'effet était incertain chez les hommes et les femmes (R-1.02, CI 95 lbs-[0,66-1,55] . . . . . L'effet sur l'échec microbien chez les femmes ou les hommes et les femmes ordinaires ne peut pas être estimé. Les EI de l'accord ont été le plus souvent signalés, pas sévère. En comparaison, il n'y a pas d'étude pour estimer l'anti-inflammatoire ou la réinfection. Comparer.

d35f11698e4898.pdf , medieval dance music aleslampida , domino's pizza nutrition pdf , asi se dice answer key , betarusajexixof.pdf , mp3 doenuestueruecue youtube , panok-nojejamigim.pdf , learning easylanguage strategies pdf , magnavox tv dvd vcr combo ebay , besezo.pdf , the prom tickets discount , vobovid.pdf , sean kyle swayze death ,